

CHECKLIST VACINAÇÃO



Plano de ação

1

PLANEJAMENTO

ESTE PLANEJAMENTO DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTAMENTE COM O MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL PELO REBANHO.

2

AQUISIÇÃO

AS VACINAS A SEREM UTILIZADAS DEVEM SER APROVADAS PELO MAPA E ADQUIRIDAS EM LOJAS REGISTRADAS.

3

CONSERVAÇÃO DAS VACINAS

AS SOBRAS DE FRASCOS ABERTOS (AINDA COM VACINA) QUE NÃO FORAM UTILIZADAS POR COMPLETO DEVEM SER DESCARTADAS, JUNTAMENTE COM OS FRASCOS VAZIOS. ALGUNS LOCAIS OFERECEM O RECOLHIMENTO DESES MATERIAIS (LOGÍSTICA REVERSA).

NUNCA UTILIZAR PRODUTOS COM FRASCOS ABERTOS (SOBRAS) OU VENCIDOS.

NUNCA DESCARTE NA NATUREZA OU LIXO COMUM.

PROCEDIMENTO: FEBRE AFTOSA

SEGUNDA ETAPA: DE 1º A 30 DE NOVEMBRO
DEVEM SER VACINADOS BOVINOS E BUBALINOS
COM IDADE DE ZERO A 24 MESES.

- Contatar o Médico Veterinário
- Definir os animais a serem vacinados
- Definir a melhor data para a aplicação
- Alinhar o “evento” com os colaboradores, mantenha os cuidados disponibilizando álcool gel 70%, e uso de máscara;

- Comprar a quantidade de doses compatível com o número de animais
- Exigir a nota fiscal
- Conferir o número de partida, data de fabricação e prazo de validade

- Cuidado com a conservação das vacinas durante o transporte e permanência na propriedade
- Manter a faixa de temperatura recomendada por cada fabricante, sendo na maioria a temperatura ideal entre 2 °C e 8 °C; não congelar.
- Caixa térmica com gelo (três partes de gelo para cada parte de vacina), levar no dia da compra para transporte e no dia do manejo;
- Ao chegar na propriedade - manter os frascos na geladeira (conferir temperatura) até o dia do uso;
- Se a vacina congelar deverá ser descartada;
- As vias de administração e doses devem ser obedecidas conforme recomendação do laboratório fabricante e orientação do médico veterinário

CHECKLIS AFTOSA



4 AGULHAS

EVITE A DISSEMINAÇÃO DOENÇAS INFECCIOSAS PARA O SEU REBANHO. DOENÇAS VIRais , BACTERIANAS E ATÉ MESMO PARASITÁRIAS -EX: (TRISTEZA PARASITÁRIA BOVINA) PODEM SER TRANSMITIDOS DE UM ANIMAL PARA OUTRO ATRAVÉS DA AGULHA CONTAMINADA. PORTANTO, TER VÁRIOS JOGOS DE AGULHAS ESTERELIZADOS PODE SER UM FATOR MUITO IMPORTANTE NO MANEJO E SEGURANÇA SANITÁRIA DO REBANHO.

- Esterilizar as agulhas em água fervente, por 15 minutos;
- Reservar-lás em caixas esterelizadas de plástico ou aço inoxidável;
- Trocar de agulha a cada (10) dez animais, substituindo por outra esterilizada.
- Separar uma agulha para a retirada da vacina do frasco, para evitar a contaminação de todo conteúdo do frasco;
- Descartar as agulhas em recipiente apropriado em local identificado como contaminado.

5 PISTOLA

AS PISTOLAS DEVEM SER CALIBRADAS COM FREQUÊNCIA PARA GARANTIR QUE O VOLUME CORRETO DA VACINA ESTEJA SENDO APLICADO NOS ANIMAIS. VOLUMES MENORES PODEM NÃO PROTEGER OS ANIMAIS.

- Assegurar que as pistolas estejam calibradas e as agulhas adequadas para a via de aplicação;
- Durante a vacinação, manter a pistola e os frascos de vacina dentro da caixa de isopor com gelo enquanto não estiver em uso;
- Utilizar somente pistolas e agulhas desinfectadas por fervura durante pelo menos 15 minutos .

6 CONTENÇÃO E APLICAÇÃO

O ESTRESSE ANIMAL LEVA À LIBERAÇÃO DE MEDIADORES QUÍMICOS QUE PODEM DIMINUIR DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA À VACINA.
O MANEJO ADEQUADO EVITA PREJUÍZOS! OS ANIMAIS NÃO DEVEM PERMANECER PRESOS POR UM PERÍODO LONGO E, APÓS A VACINAÇÃO, DEVE SER DISPONIBILIZADO ACESSO À ÁGUA E AO ALIMENTO.

- Conduzir os animais de forma tranquila e calma para diminuir o estresse e poeira;
- É recomendado conter individualmente os animais para a aplicação da vacina para reduzir o risco de acidentes;
- Não vacinar animais debilitados ou submetidos a atividades desgastantes.

7 DIA DO MANEJO

APROVEITE ESSE MOMENTO PARA OTIMIZAR E POTENCIALIZAR SEU TEMPO, CONFIRA SE O ANIMAL ESTÁ COM AS VACINAS/VERMÍFUGOS EM DIA, SE NO GERAL O ANIMAL NÃO TEM FERIDAS, BICHEIRAS, CARRAPOTOS,PROBLEMAS NO CASCO OU NOS CHIFRES, REALIZE A PESAGEM NO ANIMAL E CONFIRA SUA NUMERAÇÃO, BRINCOS/BOTONS.

- O local (tronco e brete) deve ter condições adequadas para a movimentação e contenção dos animais.
- Para facilitar o manejo, pode-se realizar mais de uma vacina na mesma ocasião;
- Analise prévia da saúde e bem estar do animal;
- Tenha mesa de apoio; para anotações e equipamentos;
- O registro da vacinação deve ser realizado, contendo os animais vacinados, a data de vacinação, o número de partida, o laboratório e a validade da vacina;